

ボツリヌストキシン注射（ボトックス・ニューロトックス）によるシワ治療を受けられる患者様へ

ボツリヌストキシンは、ボツリヌス菌から抽出されたタンパク質の一種で、欧米ではこの治療は10年以上前から行われています。顔の様々なシワのほか、全身の美肌にも効果を発揮します。ボツリヌストキシンには筋肉を弛緩（麻痺）させる効果があり、それによって表情時にシワが出来なくなります。

ボツリヌストキシンは体内で分解されるため効果はおおよそ3~4ヶ月持続しますが、やがて元の状態に戻ります。しかし二回目以降は効果の持続は約6ヶ月程度まで長くなります。まれに体質によって治療の繰り返しによって抗体ができ、効果が少なくなる事もあります。治療後は洗顔（治療部位はやさしく洗う）、洗髪、入浴は当日より可能ですが、注入部位のマッサージや激しい運動は、1週間は控えて下さい。直後の注入部位は蚊に刺されたように少し膨らみますが、数時間で消失しますので、その間は直接触らない様にして下さい。また注射部位に内出血を起こす事もありますが、通常1週間程度で消失します。

- * ボツリヌストキシン注入後、3ヶ月以内の妊娠は避けて下さい。
- * ボツリヌストキシンは製造過程でB型、C型肝炎やHIVなどの既知感染症検査は行われていますが、未知の感染症の可能性については完全に否定出来ません。
- * 額・目尻・眉間は治療後1週間して効果が弱いと感じた場合、ご相談・診察の上、再注入を無料で行います（一ヶ月保証）。ただし再注入は治療後1ヶ月を過ぎた日にちではお受け出来ませんのでご注意下さい。

注入部位別合併症

額・目尻・眉間：頭が重く感じたり、眉が上がりにくくなったり、一時的にものが見えにくい感じがする事があります。特に効果の程度によって表情がいつもと違うようになることもあり、効果が出過ぎた場合すぐに戻す事は出来ませんが、薬剤の効果が切れれば（約3~6ヶ月ほど）時間とともに必ずもとに戻りますのでご安心下さい。

エラ：一時的に食べ物が噛みにくくなる場合があります。

私_____はこれらの注意事項を読み、十分理解・承諾した上で治療を希望します。

平成 年 月 日

氏名_____